

ШКАЛА ДОСТИГАЕМОГО УРОВНЯ ХС ЛНП НА ОСНОВЕ SCORE2 ИЛИ ДЛЯ ЛИЦ С ССЗ



О шкале

Категория сердечно-
сосудистого риска

ЦУ ХС ЛНП, ммоль/л**

Умеренный

Высокий

Очень высокий

Исходный уровень ХС ЛНП

МНН	Бренд	~ % снижения уровня ХС ЛНП	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,7	4,0	4,3	4,5	4,8
АТВ 10 мг	АТОРИС	35 ²	0,98	1,17	1,37	1,56	1,76	1,95	2,15	2,41	н/д*	н/д*	н/д*	н/д*
АТВ 20 мг	АТОРИС	44 ²	0,84	1,01	1,18	1,35	1,51	1,68	1,85	2,08	2,24	2,41	2,52	н/д*
АТВ 30 мг	АТОРИС	46 ³	0,81	0,97	1,13	1,30	1,46	1,62	1,78	2,00	2,16	2,32	2,43	2,59
АТВ 40 мг	АТОРИС	48 ⁴	0,78	0,94	1,09	1,25	1,40	1,56	1,72	1,92	2,08	2,24	2,34	2,50
АТВ 80 мг	АТОРИС ^{40 мг x 2}	55 ⁶	0,68	0,81	0,95	1,08	1,22	1,35	1,49	1,67	1,80	1,94	2,03	2,16
РЗВ 5 мг	Роксера	40 ³	0,90	1,08	1,26	1,44	1,62	1,80	1,98	2,22	2,40	2,58	н/д*	н/д*
РЗВ 10 мг	Роксера	46 ⁴	0,81	0,97	1,13	1,30	1,46	1,62	1,78	2,00	2,16	2,32	2,43	2,59
РЗВ 15 мг	Роксера	50 ⁷	0,75	0,90	1,05	1,20	1,35	1,50	1,65	1,85	2,00	2,15	2,25	2,40
РЗВ 20 мг	Роксера	52 ⁴	0,72	0,86	1,01	1,15	1,30	1,44	1,58	1,78	1,92	2,06	2,16	2,30
РЗВ 40 мг	Роксера ^{20 мг x 2}	57 ⁵	0,65	0,77	0,90	1,03	1,16	1,29	1,42	1,59	1,72	1,85	1,94	2,06
РЗВ 10 мг + ЗЗЕ 10 мг	Роксера-Плюс	60 ⁸	0,60	0,72	0,84	0,96	1,08	1,20	1,32	1,48	1,60	1,72	1,80	1,92
РЗВ 20 мг + ЗЗЕ 10 мг	Роксера-Плюс	65 ¹	0,53	0,63	0,74	0,84	0,95	1,05	1,16	1,30	1,40	1,51	1,58	1,68
РЗВ 40 мг + ЗЗЕ 10 мг	Роксера-Плюс	70 ⁵	0,45	0,54	0,63	0,72	0,81	0,90	0,99	1,11	1,20	1,29	1,35	1,44

*Рекомендуется другая терапия для достижения ЦУ ХС ЛНП

ПРИ ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ХС ЛНП СЛЕДУЕТ ПРОДОЛЖАТЬ ТЕРАПИЮ!¹

Скомбинированная таблица с использованием микшерических источников. **Также при достижении 50% снижения ЦУ ХС ЛНП в группе пациентов высокого и очень высокого СС риска.

Сокращения: АТВ – аторвастатин; РЗВ – розувастатин; ЗЗЕ – эзетимиб; МНН – международное непатентованное наименование; ЦУ ХС ЛНП – целевой уровень холестерина липопротеинов низкой плотности; ССЗ – сердечно-сосудистые заболевания; ОКС – острый коронарный синдром; н/д – нет данных; НОА – Национальное общество по изучению атеросклероза.

Источники информации: 1. Клинические рекомендации. Нарушения липидного обмена. Российское кардиологическое общество. – 2023. – с. 20, 39, 88, 92, 93, 95, 96, 101 2. Сусков А.В., др. Рандомизированное исследование FARWATER. Часть II. Эффект аторвастатина на функцию эндотелия, релаксацию и жесткость сосудистой стенки. Кардиоваскулярная терапия и профилактика 2007; 7 (3): 66-73 3. Law M.R., et al. Quantifying effect of statins on low density lipoprotein cholesterol, ischaemic heart disease, and stroke: systematic review and meta-analysis. BMJ. 2003 Jun 28; 326 (7404): 1423-4. Jones PH, et al. Comparison of the efficacy and safety of roxustatin versus atorvastatin, simvastatin, and pravastatin across doses (STELLAR® Trial). Am J Cardiol 2003; 34: 15-32(2); 152-69 5. Ballantyne C.M., et al. Efficacy and safety of rosuvastatin 40 mg alone or in combination with ezetimibe in patients at high risk of CVD. Am J Cardiol 2007; 99(5): 673-80 6. Collins H., et al. Interpretation of the evidence for the efficacy and safety of statin therapy. Lancet 2016; 388: 2532-617 7. Smeekens J. The efficacy and safety of rosuvastatin dose titration in the treatment of patients with hyperlipidemia (ROSL-PATH). Statistical analysis report. Data on file. KPIA, d.d., Novo mesto, 2014. 8. Ballantyne C.M., et al. Efficacy, safety and effect on biomarkers resulted to cholesterol and lipoprotein metabolism of rosuvastatin 10 or 20 mg plus ezetimibe 10 mg vs simvastatin 40 or 80 mg plus ezetimibe 10 mg in high-risk patients: Results of the GRAVITY randomized study. Atherosclerosis 2014; Jan; 232(1):86-93.

Как
пользоваться
шкалой?

Комментарии
Ежова М.В.,
д.м.н., профессор,
Президент НОА

через 8±4 нед. до достижения ЦУ, за
искл. пациентов с ОКС – через 4-6 нед.

Расчет ЦУ ХС ЛНП в
зависимости от терапии

SCORE2 и SCORE 2-OP
10-летний риск СС событий (фатальных и нефатальных)
в популяции очень высокого риска ССЗ

<50 ЛЕТ	<50-69 ЛЕТ	≥70 ЛЕТ
● <2,5%	● <5%	● <7,5%
● 2,5 – <7,5%	● 5 – <10%	● 7,5 – <15%
● ≥7,5%	● ≥10%	● ≥15%

Систолическое
артериальное
давление (мм.рт.ст.)

женщины

некурящие

курящие

мужчины

некурящие

курящие

SCORE 2-OP	30-39 40-49 50-59 60-69				30-39 40-49 50-59 60-69				Ммоль/л Мг/дл	30-39 40-49 50-59 60-69				30-39 40-49 50-59 60-69			
	150	200	250		150	200	250			150	200	250		150	200	250	
160-179	62	63	64	65	65	66	67	68	Возраст (лет)	49	54	59	64	49	54	59	64
140-159	60	61	62	63	63	64	65	66		48	53	58	63	48	53	58	63
120-139	58	59	60	61	61	62	63	65		47	52	56	61	47	52	56	61
100-119	56	57	58	60	59	60	61	63		46	50	55	60	46	50	55	60
160-179	53	54	55	57	59	60	62	63	85-89	44	48	52	56	47	51	55	59
140-159	50	51	52	54	56	57	59	60		42	46	49	53	45	49	52	56
120-139	47	48	49	51	53	54	56	57		40	43	47	51	43	46	50	54
100-119	44	45	47	48	50	51	53	54		38	41	45	48	40	44	48	51
160-179	44	46	47	48	53	55	56	58	80-84	40	42	45	48	45	48	51	54
140-159	41	42	43	45	49	51	52	53		37	39	42	44	42	44	47	50
120-139	37	39	40	41	46	47	48	49		34	36	39	41	39	41	44	47
100-119	34	35	36	37	42	43	44	46		31	33	36	38	36	38	41	43
160-179	37	38	39	41	48	49	51	52	75-79	35	37	39	40	43	45	47	49
140-159	33	34	35	36	43	44	46	47		32	33	35	36	39	41	42	44
120-139	29	30	31	32	39	40	41	43		28	30	31	33	35	36	38	40
100-119	26	27	28	29	34	36	37	38		25	26	28	29	31	33	34	36
160-179	27	28	30	31	41	42	44	46	70-74	26	28	30	32	36	39	42	44
140-159	22	23	24	26	34	36	37	39		22	24	26	27	31	33	36	38
120-139	18	19	20	21	28	30	31	33		18	20	21	23	26	28	30	33
100-119	15	16	16	17	23	24	26	27		15	17	18	19	22	24	26	28
160-179	20	21	22	24	33	35	37	39	65-69	20	23	25	27	31	33	36	40
140-159	16	17	18	19	27	29	30	32		17	19	20	22	25	28	31	33
120-139	12	13	14	15	22	23	25	26		14	15	17	18	21	23	25	28
100-119	10	11	11	12	17	18	20	21		11	12	14	15	17	19	21	23
160-179	14	15	17	18	26	28	31	33	60-64	16	18	20	23	25	28	32	35
140-159	11	12	13	14	21	23	24	26		13	14	16	18	21	23	26	29
120-139	8	9	10	11	16	18	19	21		10	11	13	15	17	19	21	24
100-119	7	7	8	9	13	14	15	16		8	9	10	12	13	15	17	19
160-179	10	11	12	14	21	23	25	28	55-59	12	14	16	19	21	24	28	31
140-159	8	9	9	11	16	18	19	22		10	11	13	15	17	19	22	25
120-139	6	6	7	8	12	13	15	17		7	9	10	12	13	15	17	20
100-119	4	5	5	6	9	10	11	13		6	7	8	9	10	12	14	16
160-179	7	8	9	10	16	18	21	23	50-54	9	11	13	16	17	20	24	28
140-159	5	6	7	8	12	14	15	17		7	8	10	12	13	16	18	22
120-139	4	4	5	6	9	10	12	13		5	6	8	9	10	12	14	17
100-119	3	3	4	4	7	8	9	10		4	5	6	7	8	9	11	13
160-179	5	6	7	8	13	15	17	19	45-49	7	9	11	13	14	17	20	24
140-159	4	4	5	6	9	11	12	14		5	6	8	10	11	13	16	19
120-139	3	3	3	4	7	8	9	10		4	5	6	7	8	10	12	14
100-119	2	2	2	3	5	6	6	7		3	4	4	5	6	7	9	11
160-179	2	2	2	3	5	6	6	7	40-44	3	4	4	5	6	7	9	11
140-159	2	2	2	3	5	6	6	7		3	4	4	5	6	7	9	11
120-139	2	2	2	3	5	6	6	7		3	4	4	5	6	7	9	11
100-119	2	2	2	3	5	6	6	7		3	4	4	5	6	7	9	11

Информация предназначена для медицинских
и фармацевтических работников



Заказчик размещения рекламы ООО «КРКА ФАРМА»
125212, г. Москва, Головинское шоссе, д. 5, корп. 1
Тел.: (495) 981-10-95, факс: (495) 981-10-91. E-mail: info.ru@krka.biz, www.krka.ru

SCORE 2 – систематическая оценка коронарного риска 2 (Systematic Coronary Risk Estimation 2) и SCORE 2-OP – систематическая оценка коронарного риска 2 для пожилых лиц (Systematic Coronary Risk Estimation 2-Older Persons) для оценки риска фатальных и нефатальных (инфаркт миокарда, инсульт) ССЗ в популяции с очень высоким риском ССЗ

Клинические рекомендации. Нарушение липидного обмена.
Российское кардиологическое общество. – 2023. – с. 101